





Cuándo conservar a su hijo

De regreso a casa desde la escuela

A continuación se presentan sugerencias sobre cuándo mantener a su hijo en casa cuando No se siente bien. Comuníquese con un proveedor de atención médica si su hijo necesita atención médica. Si no está seguro de si su estudiante debe regresar a la escuela, llévalo a la oficina de la escuela y un empleado de salud o una enfermera lo ayudarán.



Síntoma de enfermedad	¿Cuándo debe mi hijo quedarse en casa y cuándo puede regresar?
 <p>En general, no me siento bien.</p>	<p>QUÉDESE EN CASA SI alguna enfermedad o síntoma nuevo impide que un niño participe de manera significativa en las actividades de rutina.</p>
 <p>Fiebre</p>	<p>QUÉDESE EN CASA SI tiene fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más.</p> <p>REGRESO CUANDO la fiebre desapareció durante la noche y desapareció por la mañana sin el uso de medicamentos como Tylenol® , Advil® , o Motrin® (acetaminofén o ibuprofeno).</p>
 <p>Vómitos</p>	<p>QUÉDESE EN CASA SI ha vomitado 2 o más veces en 24 horas.</p> <p>REGRESE CUANDO los vómitos hayan cesado durante la noche y su hijo pueda retener líquidos y alimentos. Se recomienda lavarse las manos con frecuencia.</p>
 <p>Diarrea</p>	<p>QUÉDESE EN CASA SI es probable que las heces de su hijo se filtren del pañal o si es poco probable que llegue al baño a tiempo (si ya sabe ir al baño). Si las heces tienen sangre o son negras, busque atención médica.</p> <p>REGRESAR CUANDO mejore. Se recomienda lavarse las manos con frecuencia.</p>

Cuándo conservar a su hijo

De regreso a casa desde la escuela

Síntoma de enfermedad	¿Cuándo debe mi hijo quedarse en casa y cuándo puede regresar?
 <p>Dolor de garganta</p>	<p>SE PUEDE ASISTIR CON SÍNTOMAS LEVES.</p> <p>QUÉDESE EN CASA Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA en caso de dificultad para respirar o tragar, o babeo continuo.</p> <p>REGRESE CUANDO MEJORE. Si le recetan antibiótico, tome la primera dosis al menos 12 horas antes de regresar.</p>
 <p>Síntomas del resfriado, como tos, congestión nasal, estornudos.</p>	<p>SE PUEDE ASISTIR CON SÍNTOMAS LEVES. Considere usar mascarilla si tiene 2 años o más.</p> <p>QUÉDESE EN CASA Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA en caso de síntomas graves, que incluyen tos intensa, dificultad para respirar o dificultad para recuperar el aliento o sibilancia cuando no se controla con medicamentos (como albuterol).</p> <p>REGRESO CUANDO MEJORE. Si su hijo necesitará medicación después de regresar, comuníquese con el centro para informarles.</p>
 <p>Irritación de oídos u ojos, incluida conjuntivitis</p>	<p>SE PUEDE ASISTIR CON SÍNTOMAS LEVES.</p> <p>Se recomienda lavarse las manos con frecuencia.</p> <p>QUÉDESE EN CASA Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA por dificultad para ver o escuchar, una lesión en el ojo o un dolor que no pueden tolerar.</p>
 <p>Erupción</p>	<p>SE PUEDE ASISTIR CON SÍNTOMAS LEVES.</p> <p>QUÉDESE EN CASA Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA si el sarpullido empeora, causa dolor, tiene ampollas o no cicatriza.</p> <p>REGRESE CUANDO MEJORE o según lo indique el médico. En general, en el caso de afecciones como piojos, impétigo, tiña, sarna y oxiuros, su hijo puede regresar tan pronto como comience el tratamiento adecuado.</p>